

## 切记

有任何担心之处均请查问

- 将药品放在小孩无法触及到的地方
- 每次喂药前均要核对是否有必要服药
- 了解喂药的正确剂量以及药品的强度
- 两次喂药间隔不得少于4小时, 每24小时喂药次数不得超过4次
- 如果有别人帮您照看小孩, 问清楚有没有给孩子喂过扑热息痛、喂了多少、何时喂的药
- 检查喂过的其他药品, 里面可能含有扑热息痛

## 喂药剂量记录表

儿童姓名 \_\_\_\_\_

日期 和 时间	體重 (公斤)	药品强度 120毫克/5毫 升 250毫克/5毫 升	剂量 (毫升)

## 联系号码

- 24小时免费健康热线提供健康咨询服务, 号码为: **0800 611 116**
- 如果您给孩子喂药过量, 请立刻给您的家庭医生、护士或者中毒中心打电话, 号码为: **0800 POISON** (0800 764 766)

本指南仅供参考, 不能代替家庭医生、药剂师以及护士的医嘱

请发电邮至 [feedback@saferrx.co.nz](mailto:feedback@saferrx.co.nz) 索取材料



## (Paracetamol)

婴幼儿和儿童扑热息痛-对乙酰氨基酚喂药

安全

Giving Paracetamol Safely to Babies and Children (Chinese)

过量喂服扑热息痛-对乙酰氨基酚会导致危险

## 扑热息痛-对乙酰氨基酚是什么？

该药是镇痛和缓解儿童发烧症状的药物。

- 该药不会导致儿童犯困或嗜睡
- 该药可供儿童和3个月以上的婴儿服用。
- 年幼儿童必须要看医生

## 我的孩子是否需要该药？

只有在需要时才给孩子喂扑热息痛

- 在您的孩子觉得发烧而且感觉非常难受时才给孩子喂药 (体温高于 38.5摄氏度)

## 什么是正确的剂量？

喂药的剂量取决于您孩子的体重和扑热息痛的强度

- 先称好您孩子的体重，再查询表格内的剂量
- 检查药的强度，有两种强度
- 请药剂师、医生、或护士拿给您看清楚

## 剂量表

孩子的体重 (公斤)	120毫克/5毫升	250毫克/5毫升
等于或少于5 公斤	询问医生	询问医生
6.5公斤	4毫升	2毫升
8公斤	5毫升	2.5毫升
10公斤	6毫升	3毫升
15公斤	9毫升	4.5毫升
20公斤	12毫升	6毫升
30公斤	18毫升	9毫升
40公斤	25毫升	12毫升

## 在每次喂药前

均要检查确定您的孩子是否有必要服药

- 两次喂药间隔不得少于4小时；每24小时喂药次数不得超过4次
- 不断检查喂药的剂量; 在以上绿色的表格内做记录并检查上次是什么时候喂的药

剂量始终要量准确

请向药剂师或护士索要口服注射针管

## 我应该在哪里存放扑热息痛？

放在孩子无法触及的高处

- 最常见的中毒情况都是发生于孩子自己服药
- 药品不必冷藏：不要在冰箱里保存
- 应该有一个防止小孩拧开的瓶盖 – 请向药剂师询问

## 一旦我给孩子喂药过量会发生什么情况？

过量喂服扑热息痛会损坏您孩子的肝脏

- 如果您给孩子喂药过量, 请立刻给家庭医生、护士或中毒中心打电话，号码为: **0800 POISON** (0800 764 766)
- 剂量过大可能会出现恶心、呕吐、腹泻、皮肤或眼睛发黄、没有胃口、迷糊或极度犯困等症状